

DEPREM SONRASI YAŐLI KİŐİLERDE AŐILAMA

- Öncelikle Sađlık Bakanlıđı tarafından önerilen aŐılama programındaki eksik aŐılar var ise tamamlanmalıdır.
- Tüm yaŐlı bireylerin pnömokok, grip, Covid-19 ve tetanoz aŐılanma durumu öncelikle gözden geçirilmelidir.
- Deprem nedeni ile ağır yaralanan herkes için tetanoz aŐısı (Td) uygulanmalıdır.
- Hafif yaralanma durumlarında ise son 5 yılda aŐısı olmayan bireylerin tetanoz aŐılanma durumu kontrol edilerek, eksik aŐılanma var ise tetanoz aŐısı yapılmalıdır.

DEPREM SONRASI YAŐLI KİŐİLERDE AŐILAMA

- Pnömokok aşısı eksik olan ve toplu yaşam alanlarında kalan yaşlı bireylere ivedilikle pnömokok aşısı uygulanmalıdır.
- Kalabalık ortamlarda bulunan yaşlı bireylerde influenza mevsimi geçmiş olmasına rağmen, yıllık aşılması yapılmamış ise influenza aşısı yapılmalıdır.
- Eksik Doz COVID-19 aşılamaı deprem mađduru olan bireylerde tamamlanmalıdır. Yıllık hatırlatma dozu yapılmalıdır.
- Kalabalık ortamlarda özellikle çocukların bulunduđu ortamlarda kalan yaşlı bireylerde tek doz bođmaca aşısı uygulanabilir.

DEPREM SONRASI YAŞLI KİŞİLERDE AŞILAMA

- Hepatit A hastalığı için daha önce Hepatit A geçirmemiş yaşlı bireyler HAV aşısı ile aşılanabilir.
- Hepatit B geçirmemiş ve daha önce aşılanmamış yaşlı bireyler HBV aşısı ile aşılanabilir.
- Temin edilebilirse; 50 yaş ve üzeri bireylere Zona zoster aşısı (rekombinan aşı) uygulanabilir.